

โรคติดต่อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดต่อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงก่, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์


อาการ



มีไข้



ปวดศีรษะ



ตาแดง



มีผื่นแดง



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ



หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 -7 วัน



ปกติ



ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

การป้องกัน

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...



1 พักผ่อนให้เพียงพอ

2 ดื่มน้ำมาก ๆ



3 หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินแอสไพริน



1 เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง



2 เก็บขยะ ดัดแยกขยะ และทิ้งให้เรียบร้อย



3 เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้สนิท หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และอาศัยอยู่ในบ้าน

หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์

กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข